

(ESP: Desplaza la página hacia abajo para español)

**PLEASE READ CAREFULLY!
FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS WILL PLACE YOUR PET
AT SERIOUS RISK FOR INJURY AND INFECTION.**

PAWS Chicago is not responsible for any problems that result from failure to follow these instructions.

1. **For the next 10 days, keep your pet calm, quiet and with as little activity as possible. DO NOT allow any type of jumping, running or rough play** – afterward, gradually resume normal activity. Keep your pet away from other animals and children for at least 48 hours (or longer if necessary). We hope that your pet does not live outdoors but even if this is the case, keep him indoors and follow these instructions.
2. **DO NOT allow your pet to lick or chew at the incision.** This can open the incision and cause very serious complications. We provide dog patients with an Elizabethan Collar (e-collar) that must be worn for 10 days. Please ensure that the incision is fully healed before removing the cone. If you are in need of an additional collar, they can be purchased at a pet store or at the PAWS Chicago. We do not provide collars for cats.
3. **The incision must be kept dry** for seven (7) days. Do not wash or clean the incision – if you do, you may introduce infection. Bathing is prohibited for at least one (1) week after surgery.
4. **Observe the incision daily for Swelling, Bleeding, Discharge, Redness or Wound Gaping.** These are not always emergencies, but if it seems excessive, call (773) 521-7729. You can take a picture of the incision site daily to track the healing process. Pictures can be emailed to the clinic to ask for advice from our medical staff.
5. **After 7 p.m. tonight offer your pet a small amount of food and water** – about 1/2 of the amount you would normally feed them. You can offer ice cubes/chips if your pet enjoys them. Resume normal feeding the day after surgery. In general, lack of appetite, vomiting or depression is normal following surgery, but after 24 hours any one of these may indicate a problem. Call our office at (773) 521-7729 for a complimentary recheck of the incision site within 14 days of the surgery. If your pet has food out at all times we do recommend changing to a scheduled feeding to prevent vomiting.
6. **Your pet should still urinate, even if he or she is not eating or drinking.** For the week after surgery, verify that your pet is urinating. Watch cats who share a litter box closely.
7. Some discomfort or soreness will follow surgery for 24-36 hours. Your pet should continually improve and feel better. Your pet has received an injection of pain medications, this will last in their system for 24 hours, we do recommend to reach out to your full service veterinarian for more pain medication if your pet continues to feel discomfort.
8. Your pet has buried sutures (stitches). There is no need to return for suture removal. Male cats do not require sutures. Male cats and dogs can still get an intact female pregnant 3-4 weeks after surgery, so keep them confined. It is important to spay and neuter **all** your pets—call our clinic for an appointment!
9. **Do not administer any type of medication you have at home—human medications can be deadly to pets.**

Please Note: PAWS Chicago does not automatically assume liability for post-surgical emergency treatment.

*Please click the link to our post-operative video for more information on how to take care of your pet after their surgery.

LINK: <https://tinyurl.com/3cjb7t9x>

Gracias por hacer una cita para su mascota. ¡Esterilización/castración salva vidas y hace que su mascota sea más feliz y saludable!

**¡POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE!
EL NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PODRIA PONER EN RIESGO A SU MASOTA
DE HERIDAS E INFECCION
PAWS Chicago no se hará responsable de los problemas que pueden surgir a consecuencia de no
haber seguido estas instrucciones.**

1. **NO permita ningún tipo de salto, carrera o juego brusco;** luego, reanude gradualmente la actividad normal. Mantenga a su mascota lejos de otros animales y niños durante al menos 48 horas (o más si es necesario). Esperamos que su mascota no viva al aire libre, pero incluso si este es el caso, manténgala adentro y siga estas instrucciones.
2. **NO permita que su mascota lama o mastique la incisión.** Esto puede abrir la incisión y causar complicaciones muy graves. Proporcionamos a los pacientes de perros un collar que debe usarse durante 10 días. Asegúrese de que la incisión esté completamente curada antes de retirar el cono. Si necesita un collar adicional, se pueden comprar en una tienda de mascotas o en PAWS Chicago. No proporcionamos collares para gatos.
3. **La incisión debe mantenerse seca durante siete (7) días.** No lave ni limpie la incisión; si lo hace, puede introducir una infección. Está prohibido bañarse durante al menos una (1) semana después de la cirugía.
4. **Observe diariamente la incisión** en busca de hinchazón, sangrado, secreción, enrojecimiento o abertura de la herida. No siempre son emergencias, pero si parece excesivo, llame al (773) 521-7729 . Puede tomar una fotografía del sitio de la incisión diariamente para rastrear el proceso de curación. Las fotografías se pueden enviar por correo electrónico a la clínica para pedir consejo a nuestro personal médico.
5. **Después de las 7 p.m. esta noche ofrezca a su mascota una pequeña cantidad de comida y agua** - aproximadamente la mitad de la cantidad que normalmente le daría de comer. Puede ofrecer cubitos de hielo / chips si su mascota los disfruta. Reanude la alimentación normal el día después de la cirugía. En general, la falta de apetito, vómitos o depresión es normal después de la cirugía, pero después de 24 horas, cualquiera de estos puede indicar un problema. Llame a nuestra oficina al (773) 521-7729 para una nueva verificación gratuita dentro de los 14 días de la cirugía. Si su mascota tiene comida fuera en todo momento, recomendamos cambiar a una alimentación programada para evitar vómitos.
6. **Su mascota aún debe orinar, incluso si no está comiendo o bebiendo.** Durante la semana posterior a la cirugía, verifique que su mascota esté orinando. Observe de cerca a los gatos que comparten una caja de arena.
7. Algunas molestias o molestias seguirán a la cirugía durante 24-36 horas. Su mascota debe mejorar y sentirse mejor continuamente. Su mascota ha recibido una inyección de analgésicos, esto durará en su sistema durante 24 horas, recomendamos que se comunique con su veterinario de servicio completo para obtener más analgésicos si su mascota continúa sintiendo molestias.
8. Su mascota tiene suturas enterradas (puntos). No es necesario regresar para retirar la sutura. Los gatos machos no requieren suturas. Los gatos y los perros machos aún pueden quedar embarazadas intactas 3-4 semanas después de la cirugía, así que manténgalas confinadas. Es importante esterilizar y castrar a todas sus mascotas. ¡Llame a nuestra clínica para programar una cita!
9. **No administre ningún tipo de medicamento que tenga en el hogar: los medicamentos humanos pueden ser mortales para las mascotas.**

Tenga en cuenta: PAWS Chicago no asume automáticamente la responsabilidad por el tratamiento de emergencia posquirúrgico.

*Haga clic en el link para ver a nuestro video posoperatorio para obtener más información sobre cómo cuidar a su mascota después de su cirugía.

LINK: <https://www.dropbox.com/s/ns0oldausxnrqo/Post-Operative%20Care%20Video.mp4?dl=0>